■本報特聘請吳之屏方家楨大律師爲常年法律顧問■　■內政部登記證警字第一一二七號■

長壽

于右任題

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

每份四分　第一二三期

中華民國廿三年十月十二日

每逢星期五出版　全年五十期連郵二元　國外加倍

館址　上海三馬路雲南路口幸福書局內

■本期目錄■

產後頭痛
赤痢
衰弱與不孕
毒狗瘋狗咬神方
傷寒淺說
活屋（十九）
婦女血崩與經閉
小兒傷風證治
咳嗽的副作用
經來咳嗽
小兒臍風
肺癆與塵埃之關係
實用驗方
胃潰瘍

■愛情障碍

愛香惡臭……人之恒情
鼻流濁涕……腥臭異常
愛情破產……理所必然
挽救之策……其惟保腦

程君青心爲本埠著名之小說家。平日用腦過度。致患腦漏。終日流涕。腥臭異常。其夫人惜春。深痛惡之。結婚未久。愛情破產。程君心竊憂之。遍求中西名醫。均無效驗。後無意中在友人處見長壽報上載有保腦丸可治腦漏。購服二盒。試之果效。不數日而宿疾頓愈。夫妻愛好如初云。保腦丸專治腦漏有意想不到之效每盒大洋五角不折不扣

產後頭痛

懷鳳

頭痛。爲常有之症。神經衰弱之人。常因睡眠不足。而起頭痛。發熱之時。往往波及於腦而起頭痛。若頭部全體作痛。前額又比較爲痛。同時又有發熱者。大約爲傷寒症。後頭部作痛。不問痛勢如何。不論有無熱度。即宜預防其爲腦膜炎。若後腦疼痛甚烈。且頸項強痛。大多爲腦膜炎徵象。同時泛嘔作吐者。其爲腦膜炎無疑。

產後頭痛。多屬血虛。蓋產後去血過多。不能上營其巔。而頭痛作矣。此與血虧腦弱之人。頭部常暈眩而星星作痛者同。治法。當養血益營爲主。用芎歸湯。（川芎・當歸・葱白・生姜。）或歸脾湯。去參耆。加川芎治之。又有瘀血上攻而頭痛。用桂心四分。生地炭三錢。當歸二錢。乾姜五分。蒲黃炭二錢。炒白芍一錢。生甘草五分。黑料豆三錢煎服。

素有肝風之婦女。產後血虛。肝風尤易發動。頭痛必甚。宜養血柔肝爲主。用當歸・川芎・杞子・菊花・生地・柏子仁・茯神・蔓荊子・等投之。

中上階級之婦女。產後不能安心調養。一二日後。即出外操作。貧家婦女。產後隔日。即如常操作。故往往易於感受風邪。風邪外來。頭部作痛。兩太陽穴尤甚。宜祛風疏邪。荊芥・蘇葉・薄荷・天麻・秦艽・川芎等。皆可採用。

產後。大便易秘。便秘之人。每易發生頭痛。如果係由便秘而致頭痛者。以潤下爲主。能得大便通暢。頭痛自止矣。

上海新新公司常年醫藥顧問
上海世界書局常年醫藥顧問
朱振聲……

診例

(甲)門診一元　號金不取
(乙)出診四元　路遠酌加
(丙)……四元　隔日取件
(丁)外埠問病二元　原班同件
(戊)急病隨請隨到

時間　門診上午……時至下午四時止　出診四時以後
電話　……一四九二
診所　……業里第一弄第一家
……處啓

葉勁秋醫師編
中醫基礎學
吳鐵城

本書爲研究醫學者必讀之書內容分生理病理診斷治療陰陽五大綱定價大洋六角特價對折祇售三角外埠寄費加一
上海三馬路雲南路幸福書局

婦女血崩與經閉

沈友仁

月經爲婦女發育之報使。卵……純熟之徵兆。大約一月一行。猶太陰之圓缺。海潮之朝夕。不……失其期也。太過不及。皆謂之病。太過則妄行而爲崩漏……。不及……則不至爲經閉。其妄行之勢急暴者。謂之血崩。以其暴……沖下。如山冢之猝崩也。徐緩者。謂之漏經。以其綿延不止。如漏卮之難塞也。內經曰。陰虛陽搏之崩。又曰。陰絡傷則血內溢。蓋心主血。脾統血。肝藏血。衝脈爲之固攝。任脈謂之担任……。血行……絡中。匯於衝脈。苟非陽盛搏陰。致損內絡。何至橫決……下哉。凡憂思怒勞。激動五志之火。風邪燥熱。襲入胞宮之門。皆能使陰絡損傷。衝在失守。經血暴注。急則爲崩。緩則爲漏。故有先崩後漏。先漏後崩。緩急雖殊。原因則一。不過輕重之別耳。若夫月經不至。而爲經閉者。論其大略。則有虛實兩端。虛者爲血枯。因思鬱傷心。勞倦傷脾。醉入房中。氣竭傷肝。生化不足。血海無儲。苟非怡情悅性。補養兼施。傳爲息賁風消。死不治矣。實者爲血滯。因經行未盡。形寒飲冷。七情鬱結。爲痰爲瘀。凝窒經絡。血不運行。苟非宣通緩攻。兼扶正氣。變爲血癥石瘕。治療難矣。然月經妄行。果屬病理。而月經不至。又有屬於異態之生理者。如居經之三月一行。避年之一年一至。暗經之一生不行經者。皆不得誤認爲病而妄治也。故欲知其變。先知其常。月經者。爲女子發育期至老年期內。一月一行之常事。非純粹之血液。乃子宮之排泄物也。

小兒傷風證治

蘇駝

小兒較易於感冒風邪。以致成爲傷風症。復風雖小恙。吾人往往輕視之。不知大病之所成。其始皆傷風也。此不可不注意哉。而傷風之症緣。大都發熱。晨間得淡。熱來較甚。時有咳嗽。鼻流清涕。神志日間迷臥。晚間煩躁。不得安寐。頭部眩暈。目少精神。大便或溏或秘。小溲極少。舌白。脈博約八十左右。呼吸約二十或可

治法。當先泄肺散風。如蘇葉・防風・牛蒡・前胡・薄荷・等藥。如痰多氣急者。加以蘇子・白杏仁。有積滯者。乳積用麥芽。熱積者用查肉。大便秘結。或通而不暢者。用萊菔子・六麯・枳實。甚則用瓜蔞仁・風化硝・麻仁・等藥品。如便下溏涼者。用陳皮・枳殼・帶水者。用苡仁・車前子・赤苓・通艸・硃燈芯・澤瀉・之類。神精煩躁者。用紫貝齒・茯神・生石決・等藥。咳嗽不暢。者用紫菀・吉更・之類。開泄肺氣。至二三日。可望汗泄熱退矣。

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

赤痢(上)

臧荷百

金風送爽。桐葉驚秋。痢疾生焉。作赤痢。痢之一病。自來有赤痢白痢赤白痢休息痢噤口痢刮疾諸名稱。在科學未昌明時代以前。或現在未曾受其薰陶者。執是以繩。附會其說。認爲各自爲症。原因各別。其實科學發明之現代。其原因祇亞美巴蟲與短桿狀菌而已。赤痢。白痢。赤白痢。休息痢。噤口刮疾痢云者。不過症候輕重。經過久暫。轉歸良窳。所發現象差異云爾。

現在所謂赤痢者。非往古之赤痢也。都亞美巴痢與細菌痢而言也。是法定名詞。並非徒託空言意想。信口雌黃。乃由實驗而得。蓋在一千八百七十五年曩西氏以顯微鏡檢查。於俄國農夫糞便中發見亞美巴小體。一千八百八十三年。郭后氏一千八百八十七年。卡兒吐李氏先後於患本病而死之屍體中證明之。赤痢之病原。方始確定爲亞美巴蟲。迨一千八百九十七年。日本志賀氏。又於東京發見短桿菌於本病人糞便中。彿來夕乃爾氏於非律賓亦有同樣發見。於是赤痢原因。乃大白天下。一爲亞美巴蟲。一爲短桿狀菌。

本病絕無特然發生。悉由傳染而來。大都由攜帶病原者所致。以其多存於患本病人之糞便中。故均由飛蠅逐食。始休憩於含毒糞便。既飛息於食物。若爾人者。食此物焉。於以發病。甚焉者。可蔓延至一村落。或一都市。蓋此等處所。於廁所井泉。苟建築不完。危險實多。含毒污物。不經消毒。隨意傾倒於井側者有之。投棄於川河上流者有之。飲用其水。病毒種焉。一時來大流行。

本病發生。不擇定時。然經驗所得。氣候所宜。則在五六月起始。八九月爲最猖狂。至十十一兩月。勢稍殺焉。對於男女老幼。都能侵害。似少壯者多於老人。男子多於女人。因接觸較多關係。下等社會與農夫。多罹此症。

本病不但不若患傷寒病後可得終生免疫。且有一再發作者。其本態係上述之兩種病原因侵害大腸疾病。且在直腸部位。病變尤厲。漸達上部。則漸輕微。發病部位。初僅炎性腫脹充血。次則破潰流血。成功潰瘍。

衰弱與不孕

郭柏良

衰弱之人。未必不能懷孕。常見身體瘦弱之婦女。食慾既不大。勞役又不能任者。其生殖力則頗强盛。竟有每隔一年。生育一次。連產至七八胎以上者。反之。不孕之人。未必皆爲衰弱之婦女。亦有身體肥大。外表之氣血。頗形充盛。而亦無生殖力者矣。

所謂衰弱與不孕者。乃不孕中之一因。指不孕之由於衰弱者而言。非謂衰弱之人。皆不能生育也。不孕之由於衰弱者。其身體多不壯健。面色萎黃。納食不多。頭暈。耳鳴。記憶薄孱。驚悸怔忡。其最著要之證狀。則爲月經不調。月經爲成胎之要素。人所共知者。月經不調。爲生殖機樞不健至之御象。故不能得胎。衰弱之人。月經多不調。其原因有二。一衰弱而致月經不調。一因月經不調而致衰弱。因果雖頗倒。而其不孕則一。

衰弱之婦女。因營養之不良。或勞働之太過。體力虧耗。氣血不足。於是經來不足。或經汛過期遲遲而至。或經來色淡。量又不多。或逐漸減少。以至於無。此因衰弱而致月經不調者。或因生殖器官發生疾患。以至日漸衰弱。如多白帶。淋濁。乾血痨等症。皆能虐其陰液。初則月經不調。身體力因之而衰弱矣。

因衰弱而不孕者。以調補爲先。四物湯。八珍湯。十全大補湯。歸脾湯等。皆可採用。

治毒蛇瘋狗咬神方

柳定亞

天氣熱時。毒蛇因之而漸出。瘋狗亦相繼出現。世人之爲蛇狗咬者。苦無良方。生命危險。實莫大恨事。不佞昔年在校。抄得急救良方十數種。屢驗甚效。今不憚煩屑。不避人譏。照抄數方。以示同胞。志在救人生命而已。

治瘋狗咬驗方。木鼈子一個。明雄黃一錢。錦紋大黃三錢。黑丑一錢。白丑一錢以上五藥。共爲細末。用紫銅雍正錢一枚。如無即紫銅乾隆錢亦可。煎湯調治。服後即睡。醒後大便。毒從大便下。重者再一二劑。俟血筋瀉盡即愈。傷處用杏仁搗爛。口涎調塗。忌食生冷牛馬羊肉及房事爲要。又方用萬年青葉搗汁二三杯。用陳酒送下。約二三時辰。寒熱交作。次日下瀉即愈。歷試應效。

幸福書局出版醫藥新書
地址上海三馬路雲南路轉角

婦女病　全書二冊　實售一元　外埠函購寄費一角
求孕與避孕　全書二冊　實售一元　外埠函購寄費一角
腎病研究　全書二冊　實售一元　外埠函購寄費一角
百病秘方　全書二冊　實售九角　外埠函購寄費一角
保腦新書　全書一冊　實售四角　外埠函購寄費九分
胎產問題　全書一冊　實售四角　外埠函購寄費九分

傷寒淺說(上)

鄧源和

(一)傷寒之命名　傷寒共有三種。一曰真性傷寒。即譯名腸窒扶斯。二曰副傷寒。即譯名派拉窒扶斯。三曰發疹傷寒。即譯名發疹窒扶斯。

(二)傷寒之病原菌　以上三種傷寒。均各有固有之病原菌。真性傷寒與副傷寒。其菌形相似。臨症上症狀二者亦難以區別。故昔時與真性傷寒併爲一談。至一千九百年始分別清楚。刻在上海流行者以副傷寒爲最多。舊醫所謂濕溫即指此而言。發疹傷寒。以發疹爲其特徵。所謂班疹傷寒即指此而言。

(三)傷寒之豫因　時令與傷寒。頗有關係。夏末秋初。流行最盛。當酷暑及乾燥之夏季。更易猖行。故現在之流行。適當其例。

(四)傷寒菌之媒介　被傷寒病人大小便所污染之水及飲食物。病人用過而未消毒之一切物件。坑廁附近之井水及流行地之下流河水。蒼蠅等。

(五)傷寒菌進入人體之路徑。最多由消化器進入。即由口腔嚥下。入胃。遇健康胃酸即遭殺滅。然而因過食或胃之消化力不强。胃酸無抵抗能力。迨入腸管。於是侵入腸粘膜而成其病竈作祟。所以在夏季炎熱之際。宜慎飲食。勿使胃之消化能力失却抵抗力。則雖使悞食傷寒菌。亦可免其蹂躪也。

(六)傷寒之病的變化部。確在迴腸部。幸勿悞信玄說。起自風寒。入於腠理所謂病變在迴腸部者。實有歷來屍體解剖所目覩。非憑虛結構也。

家庭醫藥

活屋(十九)

(藝庵譯)

昔有罹慢性之病。短刈頭髮。以保清潔。此非普通完全之法也。在保存之而且能清潔之爲要。夫病者對於毛髮之衛生。較健康之人爲難。臥床久者。毛髮之神經。亦必少染病氣。或拭或櫛。皆宜注意。如用櫛理髮痛。則先宜用齒疎之櫛。次再用稍密之櫛。最後之用軟拭理之。又一時不能理清。當分數日理之。今日理右側。明日理左側。又明日再理右側。如是依次理之。髮自清理而不覺少痛矣。

毛髮由外觀上言之。純爲美術的而生。故清潔一事爲最要。然無如何清潔。終有種種黴菌。附生於中。一旦不慎。且侵入體內而釀成種種之疾病。故頭與顏上。如有創口。宜留意勿使有一根毛侵入爲要。此凡業外科學者。皆宜精密注意之。如瘰癧等病施手術時。如無他異狀。大概十日前後可治。若有不潔之毛。夾入手術部。而侵入黴菌。必致釀成重大之病症焉。

在多血性之人。易生頭垢。是宜不怠髮之清術。而時以橄欖油塗頭上。以强固毛根爲要。如逢疾病初愈。不能洗髮時。宜用卵黃擦頭上。次用蜜水等充分洗之。

眉居眼之上部。保護目而且示美觀者也。古代希臘人。以美容與健康故。嘗有塗油於眉。用軟拭擦拭之者。路柱安氏曰。「眉似弓狀。掩於目上。染之無益。剃之愚極」。旨哉言焉。昔日本人於眉。嘗有剃染之風。夫眉在額上。所以防汗之侵眼部也。一旦剃去。豈不可笑。是野蠻人之惡習焉。

睫毛居眼瞼之上下。保護眼目。較眉更切。如眼瞼有病。或情慾不完全時。目中即生眼脂。而容貌爲之醜惡。是亦不可不時時注意之。

爪甚堅硬，亦由皮膚之變化而成。爲人體上之一種裝飾。且保護富於神經之指及趾尖者也。結解衣紐。搔身上癢處。皆不可缺。若手指無爪。則不能爲精密之事務。爪之生長甚遲。約八個月長一寸。若生後一次不令爪斷。活至七十歲。可達九尺之長。臥病時爪之生長極遲。蓋以活屋之經濟。先欲用於重要部分。無餘裕以助此比較的無益之裝飾焉。觀乎罹熱病之人。病後脫落毛髮者。全以此也。古有以養長爪爲美觀者。然此亦殊覺無益。除掩指部分外。皆當去之。否則積汚垢於爪與指頭之間。爲種種病源之巢窟。甚可恐焉。

經來咳嗽

香圃

月經咳嗽之病厥故有二（一）係肺經伏熱。患有咳嗽之宿疾。因月經來潮而復甚。一屬經行感冒。罹有咳嗽之新恙。因月經適臨而增劇。夫婦女經來之際。起居如常者固多。而發生變化者亦不少。古人視月經之來潮。為局部之問題。其實與全體臟腑。皆有連帶之關係。質言之。有生理上之變化。有病理上之變化。何謂生理上之變化。例如經水未來之前及已來之時。常覺腰腹重墜。如欲溲便。精神疲憊。嬾於動作。頭眩眼花象。此表示子宮充滿經水。正營新陳遞嬗之候也。俟經水已淨。上述諸恙。頓可蠲除。此生理上之變化。不可誤認為病態也。何謂病理上之變化。例如婦女心臟血液虛弱者。當經行時。易發心悸怔忡。頭暈耳鳴。夢多盜汗等象。例如婦女胃腑消化發生障礙者。當經行時。易見胃痛胸悶。泛噁嘔吐。腹脹便難等象。此因個人之特殊體質。足誘起病症因經來即病者。皆為病理上之變化。綜上以觀。月經咳嗽。其為肺部之組織衰弱。體中之抵抗缺乏。與心胃諸病。同一意義。豈不彰彰也明矣。是故經行咳嗽。屬於肺經為病固也。而致咳之由。則有肺熱與感冒之不同焉。夫肺為呼吸器官。主周身之氣。以司呼吸。為百脈之宗。以換氣血。蓋周身血液由心房能使流入衝任諸脈。實賴肺之氣泡及毛管之壁使空氣與血液中之氣質相交換也。至於肺部有熱。煎熱津液。鍛鍊成痰。逗留於內。每值經行。氣管黏膜。呼吸器因之不快。其證狀在經行之時。必見咳嗽痰黃。稠粘不爽。甚則帶血。口乾心煩諸象。治療宜潤肺化痰。兼以調經。用蛤粉炒阿膠錢半。蜜炙馬兜鈴一錢。甜杏仁三錢。川貝母錢半。水炙桑皮錢半。瓜蔞皮三錢。黑山梔錢半。紫丹參三錢。延胡索一錢。枇杷葉膏三錢(冲服)等藥。惟此方須咳久有熱。方可投服。至於風寒襲肺。肺不清肅。則津液凝聚而成痰。月經將屆。則呼吸器感受不快。即惹起一種衝動與刺激之作用。其證狀在月經期間。必見咳吐痰濁。白稠而爽。形寒鼻塞。涕多頭脹諸象。治療宜疏肺化痰。參以調經。用嫩前胡錢半。熟牛蒡錢半。紫蘇葉錢半。荊芥穗八分。苦桔梗一錢。橘紅各一錢。旋覆花錢半(包煎)光杏仁三錢。製香附錢半。川楝子三錢等藥。

咳嗽的副作用

想入非非

嘯

咳嗽。是一種病的象徵。傷風感冒。以至於肺癆。都會發生咳嗽。當然——這種咳嗽。是誰也不願意的。不過。在某種情形之下。有許多許多並不害病的人。也常會咳嗽起來。那就是我所要說的「咳嗽的副作用」了。

有一種青年人。在路上遇見了異性。或是在影院裏。電車上。見了漂亮的女性。往往故意咳嗽兩聲。希望引起女性對他的格外注意。這種咳嗽。可以叫做引誘女性的咳嗽。反過來說。女性要引諸男性。也是可用同樣的咳嗽。這是咳嗽副作用的一種。

有人們在談話。或討論事件。或演說的時候。偶然思想轉不過來。一時不能夠口若懸河般的繼續說下去。這時候最好的辦法。是假借着幾聲的咳嗽。來延宕一些些的時候。這是咳嗽副作用的第二種。

不用功的學生。平時不肯在教室中好好的聽講。考試前也不肯去好好的預備。臨時到了堂上。只得央求優秀份子的學生。給他遞小抄。但是教員在旁邊。又不能夠明白的說出話去。於是情急智生。只得用咳嗽做了暗號。通知對方快快的遞抄了。這是咳嗽副作用第三種。

膽怯的人。當着深夜獨自一人在路上行走的時候。倘使聽到一些響聲。不免毛髮聳。立疑神疑鬼。這時只得連連的咳嗽幾聲。藉以鼓起自己的勇氣。繼續着勇往前進。這是咳嗽的副作用的第四種。

兩性幽會密約。背着人相見時。藉着咳嗽一聲。作為通知到達的信號。這是咳嗽的副作用的第五種。

在萬籟俱寂的深夜。碰到樑上君子光臨時。你如已經查覺。很可不必大驚小怪。只須咳嗽兩聲。樑上君子自然肚裏明白。心照不宣。立時悄悄地溜走了。這是咳嗽的副作用的第六種。

還是那極正當的作用。就是在人們喁喁私語的時候。我經過他們背後。表示不肯竊聽他的話。預先在遠處咳嗽幾聲。使之聞之。停止了談話。所謂「將升堂。聲必揚」。這「揚」字大約也是咳嗽吧。

總而言之。除了生病而外。咳嗽很可算是一件便利的工具。至於「神而明之」。那就在乎各人的運用了。

問病須知

（一）本報醫藥顧問欄。近因問病函件。積疊如山。仝人等雖日夜答覆。一時實難清理。對於以後問病函件。不得不另訂新章。以示限制。

（二）今後如定戶欲問病者。本埠須附郵五角。外埠一元。以示限制。否則函恐不答覆。非定戶本埠一元。外埠二元。問病者須詳述「男女性別」「何時起病」「經過治療」「現在症狀」方能處方[illegible]也。

（三）凡定戶來函問病時。除照章納費外。並須寫明定單號碼。否則。作非定戶論。

實用驗方

珠嚴

風狗咬急救方

一　雄黃五錢。麝香二錢。研末。作二服。酒下。

二　胆礬末敷之。

三　紫蘇葉嚼敷之。

四　地黃搗汁。飯餅塗之。百度愈。

五　兎松雄黃研貼。即不發。

六　燈盞殘油灌瘡口。甚良。

七　粳米一合。斑蝥七枚。同炒。蝥黃去之。再入七枚。再炒黃去之。再入七枚。待米出煙。去蝥。研糯米為末。油調敷之。小便利下。

八　風狗咬毒。七日當一發。三十日不發始脫。急於無風處。以冷水洗淨。即服韭汁一盌。隔七日又一盌。四十九日。共服七盌。須百日忌酸鹹。一年忌食魚腥。終身忌食狗肉。方得保全。十則十有九死。

敬送　專治夢遺滑精奇方

益腦補腎丸

此方主治一切滑精早洩腦漏陽萎效驗驚人患者函索即寄

燕翼堂

上海西門方斜路寧康里念壹號

胃潰瘍（四）

中篇尊著

繆俊德

亦有與結腸癒着。形成胃結腸。而完穀下利。凡上述諸變。頗著重篤之症候。入於危境。而藥石之救濟。恐亦有時窮於應付矣。或問吐血色多暗褐。而有鮮紅色者。則又何說乎。曰吐血之色黑暗者。由於血液停蓄於胃已久。受胃液之消化。則呈暗色矣。若出鮮紅之血者。可知病之重篤。其由於動脈出血。或是胃之持續不定。故如此耳。然胃血吐鮮紅者。但不常見也。

（四）治療處方

當治療時期內。精神與內體。均須絕對安靜。進食須在適當之時間。免致引起刺戟而胃痛。及減少胃之分泌。更須保持潰瘍面之清潔。病家調護之良否。與預後有莫大之關係。保持潰胃清潔之方法。至為簡便。多飲開水。並可冲淡胃酸。若是經過佳良。血症已止。食慾漸漸恢復。可以徐徐進食稀粥蔬饌。總宜忌產冷煙酒。多靜養。少運動。待榮養佳良。體力復元。始能從事職業。

吐血須知

朱振聲著

今日出版

全書目錄

●吐血是否可怕……
●如何發生吐血……
●痰中帶血之研究……
●吐血之診斷法……
●吐血何以不易斷根……
●治吐血之秘訣……
●胃出血之治法……
●肺出血之治法……
●吐粉紅血之治法……
●吐血後之調理……
●古人之吐血治法……
●古人之吐血驗案……
●吐血單方五則……
●吐血問答七則……

全書洋裝一册。特價低收大洋二角。外埠另加寄費二分

上海三馬路雲南路轉角幸福書局發行

寗波姚和清眼科來滬設診

鄙人專理眼科二十餘年向在寗波百丈街設診應世夫久靜思動人之恆性鄙人亦不能例外故今來滬欲一吸新鮮空氣也而鄙人他無所長唯眼科為生平專業故今在滬上以區區之眼科貢獻社會使滬上人士目疾盡愈兩目光明欣欣然同遊此青天白日之下此則鄙人之素志也用告大衆以盡職責

△診斷　英租界牯嶺路人安里廿二號電話九五五四五號

△門診一元掛號二角

△送診　每日上午七時起以二十號為度

□出診四元四角路遠遞加

號金醫藥金分文不取以惠貧病

傷寒淺說(下)

鄧源和

㊆病理解剖所見　第一週發炎充血。第二週。充血之腸粘膜變成灰白色。而無血液供應。遂致壞死。迨壞肉脫落。即成潰瘍。第三週。因壞死脫落。發生器質缺損。而成潰瘍。本病之易發腸出血（即下血）者。即此理也。第四週。所起之潰瘍。至此時底面生新肉芽。漸漸癒合。以上所見爲眞性傷寒之病變。固此之故。眞性寒傷雖用任何法術治療。勢不能速愈也。至於副傷寒則其病的變化輕微。故其經過日期不若眞性者之長久。

㊇傷寒之主徵　熱度。爲必發之症狀。而各期不同。午前六時至九時間最低。午後五至六時間最高。舌面爲深褐色乃至灰黑色之苔所覆。舌苔。病情愈兇惡。在高熱期中。神識昏瞶。譫語不休。眞性傷寒。在第一星期終或第二星期初胸腹部發生薔薇疹。全身之發疹數。僅數十顆。迨薔薇疹退去。皮膚生小水疱。此小水疱爲發汗之結果。醫學上稱謂結晶性汗疹。俗名白痦。謂病現白痦。可無妨。而不知爲發汗所致也。

㊈傷寒之診斷法　血液培養診斷法。爲診斷眞性傷寒之最確方法。在發病第一期中已能證明有無傷寒桿菌。務望有傷寒病之疑者。勿因循自誤。宜施行早期診斷法。以證明是否傷寒病。利於法療。誠病家之福音也。

㊉傷寒結果之預測　可以下列四項現象爲標準。（甲）熱度．凡體熱高至攝氏四十度五分（華氏一〇六度）爲危險症候。若持續數日。乃必死之兆。又熱度稽留之長短。與預後之良否。成正比例。熱度高稽留長者。預後不良。經過若爲良好。則一星期後晚間雖升高。早晨則下降。幾乎無熱。

（乙）脈搏．經長期之規整。脈數不逾每分鐘一一〇次或一二〇次。均係良好之象。反此倘脈數增多而調節不整者。爲心力衰弱之預兆。結果兇惡。

（丙）譫語不休精神不安均爲危險之徵。

（丁）舌苔．舌苔深褐燥裂長久不清潔者。甚屬可慮。

⑪傷寒之復燃與復發　復燃者。熱度尚未降盡而重復升高。已消滅之薔薇疹。重復再現。脾臟再行腫大也。復發者。熱度全退盡四至十七天內。而又重復再發也。復燃與復發。均因存留於腸之傷寒菌。乘飲食不愼。精神感動。及離床太早等機會。重複構成腸之新病竈而起。二者之經過。較第一次爲短。惟其結果爲劣。蓋本病人已經久病之摧殘。於力不能再勝任也。

⑫傷寒之療法　傷寒血清及寒菌苗注射療法。愈早愈效。所以早期診斷爲治病之最大關鍵。本病者之心臟。極易爲傷寒菌所侵害。且因經過久長。心力更易衰弱。每有在病之經過中。突發心臟而致命者。若爲預防計。宜早用興奮藥强心藥。據著者之經驗。在病始已用酒類與劑而至病終爲止。

⑬飲食之議論　諺云。吃不死的痢疾。餓不死的傷寒。時至今日科學昌明時代。不能信此妄論。傷寒飲食之給養。不僅爲維持生命而已。且有治療之使命在也。因傷寒發熱之久長。體內蛋白質消耗之多。爲維持病人體力計。首當採擇營養豐富之食料。使病人不至重度之虛弱。在高熱期中。病人每日須消耗肌肉半磅。倘用適當之滋養食料。可以免除此種驚人之消耗。但昔時所慣用之大量牛乳給養。今已不適用。蓋大量牛乳飲後有惹起腸穿孔及增加膨脹之危險。粥湯雞卵菜汁橘子汁烘麵包乳烙等。均爲每日之必需品。此外固形食物並不絕對禁止。因固形食物所可慮者不在腸少血。而在易流於過量之弊。水分之供給。最宜注意。不時飲以沙濾水。每日飲可可茶或咖啡茶。每日用可可茶咖啡茶一杯。蓋病人能多飲液體。每日尿量在一立特以上。結果必良。患者如喜飲冰淇淋亦可。與以每日二食匙。時至今日。傷寒病人經過縮短。病好後貧血等虛弱狀態之減尠。大牛嘗給養療法之功也。深望病家勿再受舊習之患。

小兒臍風

尤學周

原因　乃一種微菌佔居於不潔之鐵器上。若用染有此菌之鐵器。如剪刀等以斷臍帶。或包裹臍帶之布及棉花之不潔。以致染此菌而患是症。

症狀　初發時。啼哭不安不肯吸乳。繼之牙關緊閉。四肢痙攣。唇變青色。雙手緊握。腹部膨硬。成熱度增高。此症大概發現於生產後數日。二旬以後。則不發生。

療法　殭蠶爲細末。蜜調。塗於口中用。或麝香。蠍尾。銅綠。輕粉。辰砂爲散。薑湯調服。

幸福書局代售各種良藥

地址　上海三馬路雲南路轉角

遺精散　有夢而遺　無夢而洩　久患新起　服之如神　每盒大洋一元

保腦丸　用腦過度　鼻流濁涕　頭昏異常　一服即愈　每盒大洋五角

白濁丸　白濁初起　溺管刺痛　止濁定痛　效如桴鼓　每盒大洋一元

吐血靈丹　肝火犯肺　肺絡損傷　咳紅吐血　服之立止　每盒大洋五角

獺肝定痛散　女子善鬱　肝病時發　獺肝定痛　靈驗無比　每盒大洋四角

肺癆與塵埃之關係

尤學周

塵埃飛揚之處。最不利於呼吸。吸入塵埃之多者。足以誘發呼吸器病。肺病之由來。與呼吸上大有關係。操作於空氣不潔。塵埃繁多處之人。最易發生肺病。如在木屑。紙。烟草。石炭。煤烟。石。陶器。鉛。鐵。銅等多塵埃處工作者是。印刷工人。翻砂工人。及棉絲彈織工人。尤易患之。

據調查所得。死亡一千人之中。其身體不處於塵埃中操作者。計三百餘人。而在塵埃中操作者。則爲四百餘人。又就勞動工人而調查之。不在塵埃處所工作。患癆瘵而亡。僅二人而已。在有塵埃之職業下工作。患癆瘵而亡者。則有五人。於此可證塵埃之與肺癆關係之大矣。

塵埃之足以發生肺癆。其原因有三。㊀塵埃密聚之區。其空氣必不清潔。吐故新納。爲肺臟之天職。且所以擴張本臟而使壯健者。塵埃既多。空氣必不潔。多吸濁氣。將不利於肺部。活力減弱。癆菌有可乘之機。㊁塵埃之吸入。黏著於呼吸器道。則呼吸器受其刺激。而發爲咳嗽。咳嗽者乃體內之自然作用。所以排除外來之物者也。若咳嗽之力。不足以排除之。則久咳不已。久咳傷肺。癆菌可以乘機發動。㊂塵埃之中。多含黴菌。國人惡習。隨地吐痰。既乾。痰中癆菌。隨塵埃而飛揚。於是由呼吸而傳入肺部。

故欲防肺癆。不可久居塵埃密集之區。患肺癆者。尤宜遠避。藉以飽吸新鮮之空氣。以增肺之活力。

赤痢(下)

臧荷百

本病患者。最感痛苦者。莫裏急後重若。裏急後重云者。就字意引申。則爲內裏急迫。後部壓重。其實此重字面。不足形容。不過此等字面。自古有之。今仍之耳。當時情形。不僅於此。在未便之頃。倘有似有若干糞便欲排之意。及如廁不過涓涓。迨事罷起立。又如前感。此中困苦。有非筆墨所可形容。曾患之者。方得此中三昧。其他病痛。亦頗苦痛。

至若便形。則僅數次下痢。與常糞尚無大差異。後則或爲粘液樣。或爲血樣(即所謂赤痢)或爲膿樣(即所謂白痢)。或爲粘液血樣(即所謂赤白痢)或爲粘液膿性血樣。或爲肉汁樣。或爲腐肉樣。或爲壞疽性血樣。或爲膜樣。(即所謂刮疾)。其他尚有混玻璃樣小塊若西貫米樣者。種種不一。要視病之輕重。爲準耳。排便次數。至不一定。有日凡數次者。有日凡十餘次數十次以至百餘次者。更甚者。肛門肌肉。不足克制。內容不絕漏出者有之。發熱一層。或有或無。即有亦在初期。隨後多取無熱經過。食思大概不良。經久不治。食慾全無。多陷爲惡液質(即所謂噤口痢)口渴思飲。舌背厚苔。小便稀少。間亦有嘔吐吃逆者。

如果發熱甚高。脈搏細小。舌背煤苔。皮下溢血。眼球凹陷，聲音失調。肛門失禁。是爲最重之症。多就死亡。小兒老人。多較壯歲。爲難治愈。在輕症患者。一來復即可治愈。中等者亦不過三來復可矣。重症者月餘亦可望愈。若再綿延以成慢性者（所謂休息痢）亦間有之。

在發本病之後。往往貽留耳下腺(腮腺)炎。膜腹炎。關節炎。浮腫。慢性下痢。腸管狹窄諸疾病。

本病能治愈與否。與流行性質與土地季節。頗有關係。其吃逆嘔吐。排壞疽性血樣便以及取傷寒樣經過者。均係不良之徵。多取死亡耳。

至於療治方法。甚爲乘多。在今日科學發達下之藥品。效力亦頗確實。第在一般家庭間。不能臨機關應變施用。不必縷述。偶或遇有此病發生。最好請素所信仰正式醫生療治。茲所可論及者。一般社會所應注意之事先防範耳。

在本病流行期間。有排粘液便者。均當視爲疑似病人。須與隔離。所排泄物。非經石灰水消毒。不可任意傾倒。以防病毒散布。所使用各件。非經充分消毒（煮沸日光藥物）勿給其他人使用。毋過飲。勿暴食。不潔食物。未熟瓜菓。腐敗食物。以及未經煮沸茶湯。不可飲食。其經蚊蠅棲息食物。尤不可食。與本病人接觸後。可及的消毒該部。在本病人治愈後四來復間。倘有傳染危險。亦所當注意。

赤豆治脚腫

予髫齡時。負笈滬濱。未半載。患腳腫症。由腫及脛。漸升至腹。指之成印。行步維艱。飲食日減。四肢肥大。面目全非。時居冬令。適家中有事。遣人促歸。抵家。家人大相驚駭。延醫招下。日必數起。豈知居未數日。飲食陡增。每餐三四碗。時覺腹飢。並日以赤豆湯作點心。如是旬餘。腫勢蠶消。蟾圓一易。健步如飛。（按）滬近海濱。溼氣甚重。受溼過甚。故患腳腫。指之成印者。水泛於膚也。赤豆利溼。溼去。腳腫自消。